

# Stellungnahme zur HPV-Impfung

Arbeitsgemeinschaft  
Kinder- und Jugendgynäkologie e.V.



ÄGGF

Ärztliche Gesellschaft  
zur Gesundheitsförderung e.V.

bvkj.

Berufsverband der  
Kinder- und Jugendärzte e.V.



Berufsverband der Frauenärzte e.V.

BZgA

Bundeszentrale  
für  
gesundheitliche  
Aufklärung

BVÖGD



Bundesverband der Ärztinnen  
und Ärzte des Öffentlichen  
Gesundheitsdienstes e.V.



Stiftung  
Deutsche  
Krebsgesellschaft



Gesundheitsnetz  
Rhein-Neckar



HESSISCHE  
KREBSGESELLSCHAFT E.V.



LebensBlicke  
Stiftung Früherkennung Darmkrebs

preventa  
gemeinsam vorausdenken

ROBERT KOCH INSTITUT



## Stellungnahme zur HPV-Impfung

Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendgynäkologie e.V.; Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung (ÄGGF); Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. (BVKJ); Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD); Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Berufsverband der Frauenärzte e.V.; Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ); Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V.; Deutsche Krebsstiftung; Gesundheitsnetz Rhein-Neckar e.V.; Hessische Krebsgesellschaft e.V.; LebensBlicke – Stiftung Früherkennung Darmkrebs; preventa Stiftung; Robert Koch-Institut (RKI)

In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) die Impfung gegen Humane Papillomviren (HPV) seit 2007 für Mädchen und seit 2018 auch für Jungen. HPV-Infektionen sind sehr häufig und heilen zumeist symptomlos ab. Es gibt sogenannte „low-risk“ (Niedrigrisiko) und „high-risk“ (Hochrisiko) HP-Viren. Bei persistierender/anhaltender HPV-Infektion mit Hochrisikotypen kann es über Jahre hinweg, je nach Virustyp, zur Ausbildung von Zellläsionen/Zellveränderungen, zu benignen/gutartigen, wie auch malignen/bösartigen Tumoren kommen.

Ebenfalls durch HPV-Infektionen werden die in der Bevölkerung häufig auftretenden Anogenitalwarzen (Condylomata acuminata) verursacht. Bei 70 % der Anogenitalwarzen ist eine oft länger andauernde ärztliche Therapie erforderlich.

Seit 2006 stehen in Deutschland HPV-Impfstoffe zur Verhinderung von persistierenden/anhaltenden HPV-Infektionen zur Verfügung. Weltweit wurden bislang mehr als 270 Millionen Dosen dieser Impfstoffe verabreicht. Bei einer Impfung vor HPV-Kontakt schützen

diese zu nahezu 100 % vor einer persistierenden Infektion mit zwei oder sieben „high-risk“ HPV-Typen (je nach Impfstoff). Somit können je nach Impfstoff zu etwa 70 - 90 % Krebsvorstufen, bestimmte Krebserkrankungen und deren Komplikationen verhindert werden. Einer der verfügbaren Impfstoffe kann zusätzlich sehr wirkungsvoll auch vor Anogenitalwarzen schützen. Die HPV-Impfung wird von der STIKO, dem Paul-Ehrlich- Institut (PEI) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als sicher eingestuft. Die Sicherheit der HPV-Impfung wurde in zahlreichen Studien mit hunderttausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern untersucht. Dabei wurden keine Belege für schwere, die Gesundheit nachhaltig beeinträchtigende Nebenwirkungen im ursächlichen Zusammenhang mit der HPV-Impfung festgestellt. In den Untersuchungen wurde kein Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen, neurologischen Erkrankungen oder gar Todesfällen gefunden. Es können Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Müdigkeit auch in einer schweren Form auftreten. Diese sind jedoch zeitlich begrenzt und komplett reversibel. Dies bedeutet, sie verschwinden vollständig.

Obwohl die HPV-Impfung sehr gut wirkt und sicher ist, liegt die Impfquote in Deutschland bei 17-jährigen Mädchen nur bei ca. 45 %. Dies ist für eine von der STIKO empfohlene und

von den Krankenversicherungen bezahlte Impfung sehr gering. Damit wird das Potential der Impfung, HPV-bedingte Krebserkrankungen und Todesfälle zu verhindern, bei Weitem nicht ausgeschöpft. In vielen anderen europäischen Ländern ist die Impfquote deutlich höher.

Die unterzeichnenden Organisationen möchten betonen, dass der aktuelle Stand der Wissenschaft deutlich zeigt, dass die Impfung sehr wirksam vor den HPV-bedingten Krebserkrankungen und ein Impfstoff zusätzlich vor Anogenitalwarzen schützt. Mädchen und Jungen, denen aus Überschätzung der Risiken die Impfung vorenthalten wird, haben ein nachgewiesenes höheres Risiko, im späteren Leben sowohl an bestimmten Krebsarten bzw. deren Vorstufen zu erkranken, als auch an den meist als überaus störend empfundenen, sowie oft langwierig zu behandelnden Anogenitalwarzen. Aus diesem Grund appellieren wir an die Eltern/Erziehungsberechtigten von Kindern und Jugendlichen im empfohlenen Impfalter (sowie von noch nicht geimpften 15-17-Jährigen als „Nachholimpfung“), eine informierte Entscheidung zum Schutz ihrer Kinder zu treffen, an die Fachkolleginnen und -kollegen, die Impfung aktiv anzubieten und an die Medien, ausgewogen und entsprechend der wissenschaftlichen Evidenz zu HPV und der entsprechenden Impfung zu berichten.

## **Literatur**

Arbyn M., Xu L., Simoens C., Martin-Hirsch P.P.L. (2018). Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 5. Art. No. CD009069

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und Paul-Ehrlich-Institut (2018). Bulletin zur Arzneimittelsicherheit, Ausgabe 3  
<https://www.bfarm.de/bulletin> oder <https://www.pei.de/bulletin-sicherheit>

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und Paul-Ehrlich-Institut (2019). Bulletin zur Arzneimittelsicherheit, Ausgabe 1  
<https://www.bfarm.de/bulletin> oder <https://www.pei.de/bulletin-sicherheit>

Deleré Y., Wichmann O., Klug S. J., van der Sande M., Terhardt M., Zepp F., Harder T. (2014). The efficacy and duration of vaccine protection against human papillomavirus – a systematic review and meta-analysis, Dtsch. Ärztebl. Int. 111:584-91

Harder T., Wichmann O., Klug S. J. et al. (2018). Efficacy, effectiveness and safety of vaccination against human papillomavirus in males: a systematic review. BMC Medicine 16(110):1-14

Joura E., Giuliano O., Iversen C. et al. (2015). A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithelial neoplasia in women. N Engl J Med; 372:711-23

Robert Koch-Institut (2007). Impfeempfehlungen der STIKO 2007, Epidemiologisches Bulletin 30

Robert Koch-Institut (2014). Impfeempfehlungen der STIKO 2014 mit geändertem Impfalter für die HPV-Impfung, Epidemiologisches Bulletin 34

Robert Koch-Institut (2018). Aktuelles aus der KV-Impfsurveillance – Impfquoten ausgewählter Schutzimpfungen in Deutschland. Epidemiologisches Bulletin 01

Robert Koch-Institut (2018). Wissenschaftliche Begründung für die Empfehlung der HPV-Impfung für Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Epidemiologisches Bulletin 26

Robert Koch-Institut, Ratgeber HPV (Stand: 28.06.2018)  
<https://www.rki.de/hpv-ratgeber>

Robert Koch-Institut (2018). Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut – 2018/2019. Epidemiologisches Bulletin 34

Serrano B., Alemany L., Tous S. et al. (2012). Potential impact of a nine valent vaccine in human papillomavirus related cervical disease. Infect Agent Cancer 2012; 7(1) (38)

Terhardt, M., Fischbach T. (2018). Informationen zur HPV-Impfung für Mädchen und Jungen ab 9 Jahren.  
[https://www.kinderaerzte-im-netz.de/fileadmin/pdf/HPV\\_Flyer/181017\\_KINPraxisApp\\_Infoblatt\\_HPVImpfung.pdf](https://www.kinderaerzte-im-netz.de/fileadmin/pdf/HPV_Flyer/181017_KINPraxisApp_Infoblatt_HPVImpfung.pdf)

World Health Organization (2017). Safety update of HPV vaccines  
[http://www.who.int/vaccine\\_safety/committee/topics/hpv/June\\_2017/en/](http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/June_2017/en/)

## **Links der beteiligten Organisationen**

**Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendgynäkologie**  
<https://www.kindergynaekologie.de/startseite/>

**Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung**  
[www.aeggf.de](http://www.aeggf.de)

**Berufsverband der Frauenärzte**  
[www.bvf.de](http://www.bvf.de)

**Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte**  
[www.bvkj.de](http://www.bvkj.de)

**Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes**  
<https://www.bvoegd.de/>

**Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): HPV-Infektion**  
[www.liebesleben.de/hpv](http://www.liebesleben.de/hpv)

**Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): Impfseiten > HPV-  
Impfung**  
[www.impfen-info.de/impfempfehlungen/](http://www.impfen-info.de/impfempfehlungen/)

**Deutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin**  
<https://www.dgkj.de/>

**Deutsche Gesellschaft für Urologie**  
<https://www.urologenportal.de/>

**Deutsche Krebsstiftung** c/o Deutsche Krebsgesellschaft  
[www.deutsche-krebsstiftung.de](http://www.deutsche-krebsstiftung.de)

**Gesundheitsnetz Rhein-Neckar: Modellprojekt zur freiwilligen HPV-  
Schulimpfung in Hessen**  
[www.ja-ich-auch.de](http://www.ja-ich-auch.de)

**Hessische Krebsgesellschaft e.V.**  
<https://hessische-krebsgesellschaft.de/start/>

**LebensBlicke – Stiftung Früherkennung Darmkrebs**  
<http://www.lebensblicke.de/>

**preventa Stiftung**  
[www.preventa.de](http://www.preventa.de)

**Robert Koch-Institut, Infektionsschutz > HPV-Impfung**  
[www.rki.de/hpv-impfung](http://www.rki.de/hpv-impfung)